

HÉTÉROMÈRE ET MALACODERMES NOUVEAUX,

PAR M. PIC.

Les types des présentes nouveautés figurent dans les collections du Muséum national de Paris; sauf *Listrus Luceti* et *Cantharis* v. *Cavaleriei*, ces nouveautés se trouvent, en outre, dans ma collection.

DASYTOXYSTROPUS SUBPARALLELUS V. NOV. **rufotinctus**.

Elytris subacneis, plus minusve rufo tinctis. — Brésil : St-Antonia-da-Barra (E. Gounelle, 11, 12, 1888).

La forme type a les élytres foncés, non teintés de roux, et ces organes sont plus parallèles.

CANTHARIS DAVIDIS V. NOV. **Cavaleriei**.

Testacea, articulis 2 ultimis antennarum tarsisque nigris, elytris viridibus, ad basin et apicem nitidis et fere impunctatis, ad medium opacis, fortiter et dense punctatis plicatisque. — Chine : Kouy-Tchéou (P. Cavalerie, 1910).

Diffère de la forme type par les élytres verts nettement et entièrement.

SILIDIUS PICEONOTATUS V. NOV. **Posthi**.

Thorace rufo-testaceo, immaculato. — Côte-d'Ivoire, environs de Dimbokro (Capitaine Posth, 1911).

La forme type a le prothorax marqué de noir, ou de brun, sur le disque et près des côtés postérieurs. La ♀ de cette espèce diffère du ♂ par la structure du prothorax, celui-ci étant simplement un peu échancré près des angles postérieurs qui sont un peu saillants et émoussés; chez cette espèce, l'écusson varie du brun au testacé et les antennes sont noires.

Silidius Chevalieri nov. sp.

Elongatus, subparallelus ♀, aut postice paulo dilatatus ♂; sparse pubescens, subnitidus, niger, femoribus pro parte et supra rufo-testaceis, thorace medio nigro, aut piceo notato (forma typica), aliquot immaculato (v. nov. **innotatus**); thorace ♂ valde inciso et bilobato, ♀ minute inciso.

Allongé, subparallèle ♀, ou peu élargi à l'extrémité ♂, éparsément pubescent de gris, à peine brillant, noir avec la majeure partie des cuisses et tout le dessus roux-testacé, prothorax compris (v. *innotatus*), mais plutôt avec ce dernier organe marqué de foncé sur son disque (forme type). Tête robuste ainsi que les antennes, celles-ci très pubescentes, yeux gros; prothorax large, un peu rétréci et arqué sur son milieu antérieur, sinueux sur les côtés, peu ♀, ou très échancré postérieurement ♂, avec un lobe large devant cette échancrure (entre ces lobes, il apparaît parfois une sorte d'épine) et un autre en dessous assez étroit, creusé ou échancré au bout, impressionné sur le milieu du disque; élytres un peu plus larges que le prothorax, plus ♀, ou moins ♂, longs, densément et ruguleusement ponctués, avec une trace de costule externe; pattes assez robustes, plus ou moins foncées avec le dessous des cuisses, ou leur base, diversement roux.

Longueur : 8-10 millim. — Côte d'Ivoire : pays Dyola, entre Zoanlé et Sanrou (A. Chevalier, mai 1910).

Voisin de *S. Conradti* Pic par la structure de son prothorax et d'ailleurs distinct, à première vue, par les antennes toutes noires et les élytres non marqués de foncé à leur extrémité.

Listrus Luceti nov. sp.

Elongatus, subconvexus, apice attenuatus, nitidus, sparse et breve albo pilosus, nigro subolivaceus, articulis 2 et sequentibus antennarum pedibusque rufis.

Allongé, subconvexe, atténué postérieurement, brillant, revêtu de poils courts, blancs, un peu épaissis, couchés et espacés, noir à reflets olivâtres un peu bronzés, articles 2 et suivants des antennes, ainsi que les pattes, rousses; antennes courtes, un peu épaissies au sommet; tête courte, à ponctuation granuleuse, écartée, yeux allongés; prothorax presque plus long que large, à peu près droit sur les côtés, un peu rétréci en avant, densément ponctué avec la pubescence disposée longitudinalement et en partie obliquement sur le milieu; écusson peu pubescent, élytres un peu plus larges que le prothorax, allongés, atténués à l'extrémité, éparsément ponctués, la ponctuation étant plus forte et moins écartée en avant.

Longueur : 2 millim. — Chili (Ad. Lucet, 1912).

Très voisin de *S. minor* Pic, en diffère, à première vue, par la forme un peu plus allongée, le prothorax à sculpture différente et non subarqué sur les côtés.